

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS O RÍOS Y DEMÁS FUENTE DE AGUA.
- NO APLICAR EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

CARBENGROP₅₀ SC

Grupo Químico: Benzimidazol

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida sistémico, con acción protectora y curativa.

COMPOSICIÓN:

CARBENDAZIM (*)	50% p/v
Inertesc.s.p.....	100% p/v
* Metil benzimidazol-2-ilcarbamató	

CLASE TOXICOLÓGICA IV - POCO PELIGROSO

Registro Senave N°: 3460
 Certificado de Libre Venta N°: 3018
 País de origen: Paraguay

Fecha de Fabricación: Ver Envase
 Fecha de Vencimiento: Ver Envase
 N° de Lote: Ver Envase

FABRICADO, REGISTRADO Y COMERCIALIZADO POR:



Compañía de Agroquímicos del Paraguay S.A.
 Lomas Valentinas N° 3.902
 Parque Industrial Avay - Villeta
 Tel: 595-225-952-670
 Inscripción SENAVE: A2/A3/A4/A5/A6/A7: 1.317

NO INFLAMABLE, NO EXPLOSIVO, NO CORROSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"Mantenga este producto bajo llave, fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas"

RECOMENDACIONES DE USO

CARBENGROP 50 Sc es un poderoso fungicida sistémico para el control de numerosas enfermedades fúngicas. Se absorbe por los órganos verdes y las raíces de los vegetales siendo su persistencia acción de 2 a 3 semanas. Se mezcla con agua y se aplica por distintos sistemas: inmersión, pulverización y aspersion. Se llenan las partes con una agitación. Se le agrega la cantidad a aplicar, luego se completa con agua el volumen requerido en la pulverizadora.

DOSIS Y USOS RECOMENDADOS

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
TRIGO	Fusariosis Septoriosis	<i>Fusarium spp.</i> <i>Septoria spp.</i>	0,5 -0,6 L/há	La primera aplicación al inicio de la floración y la segunda después de 8 a 10 días repetir la aplicación según la necesidad.
ARROZ	Brussone	<i>Pyricularia spp.</i>	0,5 L/há	Aplicar al inicio de la floración, repetir según la necesidad.
SOJA	Mancha ojo de rana Mancha marrón Oídio de la soja	<i>Cercospora Kikuchii</i> <i>Septoria glycines</i> <i>Microphaera diffusa</i>	0,5 L/há	Iniciar la aplicación en la floración y formación de vainas, repetir la aplicación de 15 a 20 días después

Use volúmenes mayores cuando se trata de cultivos desarrollados y volúmenes más bajos en cultivos jóvenes; pero la dosis de CARBENGROP 50 SC en mochila debe ser siempre la recomendada.

INCOMPATIBILIDAD Puede ser utilizado en combinación con la difenilamina como también mezclado con los fungicidas comunes del mercado. Los insecticidas y acaricidas deber ser agregados al caldo fungicida poco antes de la aplicación. Es incompatible con los productos fuertemente alcalinos, como caldos bordelés, polisulfuro de calcio, etc.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico utilizándose en su dosis correcta.

PERIODO DE CARENCIA: Soja 14 días y Trigo 15 días.

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOS Y DE LOS ENVASES: Realizar el triple lavado (Agregue agua hasta 1/4 del envase, cierre y agite el envase por 30 segundos, vierta el contenido en el tanque de fumigación, repita el proceso 3 veces). Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas autorizadas para el efecto.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **Inhalación:** Mueva a la víctima al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Conservar a la persona en un lugar con temperaturas agradables. Busque ayuda médica. En caso de **contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos:** lavar los ojos con abundante agua limpia o suero fisiológico, como mínimo durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien abiertos. En caso de **ingestión accidental:** Hacer un lavado de estómago. Mantener la presión sanguínea. Dar oxígeno en caso de respiración irregular. Llamar al médico. El lavado gástrico y la aportación de oxígeno debe realizarse por personas capacitadas.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antidoto específico conocido. Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Mídriasis (pupila dilatada), cefalea, cansancio, agresividad, confusión mental, sudoración, taquicardia, temblores.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós - Asunción. Teléfonos 021-220.418/204.800. HOSPITAL DE CLÍNICAS: Avda Mariscal López Tel: (021) 481 549

Contenido Neto: 1 Litro

